


Как узнать первые признаки ВИЧ - особенности заболевания



- Высокая лихорадка
- Боль в горле
- Головная боль
- Сыпь
- Инфекция в груди, кашель
- Язвы во рту
- Диарея
- Рвота
- Увеличение лимфатических узлов (шея, подмышки и пах)
- Боли в суставах и мышцах

Когда проявляются симптомы? Основные из них обычно становятся заметными в первые 2-4 недели после заражения, но проявления ранних случаев течения ВИЧ-инфекции наблюдаются не всегда, только в 70% случаев. Проявления развиваются в период через 2-12 недель после контакта. Анализ может быть положительным, если у вас был секс с ВИЧ инфицированным.

**Оставайтесь
людьми!**

ВИЧ не передается
через дружбу!



с. Поярково,
ул. Гагарина ,12

Телефоны:
8-(416-37)-4-10-28
8-909-813-25-46

ГАУ АО «Поярково-комплексный центр
социального обслуживания населения»
Отделение социальной помощи
семье и детям



**Информационный буклет для
подростков и родителей**

с. Поярково
2017 год

ВИЧ-инфекция и СПИД

Что это такое?


ВИЧ-инфекция — это медленно прогрессирующее вирусное заболевание иммунной системы, приводящее к ослаблению иммунной защиты от опухолей и инфекций. Стадия ВИЧ-инфекции, при которой из-за снижения иммунитета у человека появляются вторичные инфекционные или опухолевые заболевания, называется синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Первые сообщения о ВИЧ-инфекции и СПИДе появились в начале 80-х годов XX века. Сейчас эти названия известны даже ребенку. Такая всемирная информационная кампания стала следствием того, что болезнь распространяется в геометрической прогрессии, лекарство от нее до сих пор не найдено, и единственный способ сдержать ее распространение — научить людей избегать заражения смертельным вирусом.



Существует несколько путей заражения ВИЧ-инфекцией:

- незащищенный (без презерватива) половой акт (70-80 процентов);
- совместное использование шприцев, игл и другого инъекционного инструментария (5-10 процентов);
- переливание зараженной крови (5-10 процентов);
- передача вируса от ВИЧ-позитивной матери ребенку — во время беременности, родов и при кормлении грудью (5-10 процентов);
- использование нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга;
- использование чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с видимыми остатками крови (крайне редко).



ВИЧ НЕ передается:



через общую посуду для еды, при пользовании общим туалетом, душем и ванной, постельным бельем,



при рукопожатиях и объятиях,



через поцелуй,



через пот или слезы,



при кашле и чихании.



Вирус иммунодефицита — очень неустойчив, он

живет только в организме человека и быстро погибает во внешней среде. Поэтому невозможно заразиться ВИЧ в бассейне, при занятиях спортом, а также через укус насекомого или общение с животными.